

新生醫護管理專科學校 106 學年度 第 2 學期 護理科 護理師執照複習考 內外科護理學 科目試卷

適用科別班級：護理科四年級		學制： <input checked="" type="checkbox"/> 五專 <input type="checkbox"/> 二專	評分：
命題教師：全體內外科教師		時間： <input checked="" type="checkbox"/> 一般日 <input type="checkbox"/> 夜間班 <input type="checkbox"/> 假日班	
班級：_____		學號：_____	姓名：_____
1.	有關肝硬化病患的護理，何者為非？(A)出現肝性腦病變，應採高熱量、高蛋白飲食，以協助肝細胞再生 (B)需充分休息 (C)避免使用具刺激性的肥皂清潔皮膚 (D)可使用 lactulose 減少腸道氮含量。		
2.	有關腹水病患之護理措施，下列何者正確？(A)限制水分與蛋白質的攝取(B)每天測量體重與腹圍，並記錄輸出入量(C)可依據病患腹水情況而定，一次放液量沒有限制(D)給予利尿劑後，儘快補充Albumin。		
3.	B 型肝炎病患之血清檢查結果，下列何者顯示其具高傳染力？(A)HBsAg(-), anti-HBc(+) (B)HBsAg(-), anti-HBs(+) (C)HBsAg(+), HBeAg(+) (D)HBeAg(+), anti-HBe(+)		
4.	食道癌的特徵包括何者？1. 鱗狀上皮細胞癌最常見 2. 男性發生率高於女性 3. 好發部位是食道下段 4. 最常見症狀是體重減輕。(A)1.2 (B) 3.4 (C)1.4 (D)2.4。		
5.	完全腸道外全營養法 (total parenteral nutrition; TPN) 之敘述，下列何者錯誤？(A)TPN 突然停止輸液，需密切監測血糖變化，以防反彈性高血糖反應 (B)出現單側頸靜脈膨脹或手臂水腫時，需懷疑有靜脈血栓的可能 (C)因 TPN 屬於高張溶液，輸注時應選擇大靜脈注入 (D)TPN 管路嚴禁使用任何藥物。		
6.	消化性潰瘍病患服用 Omeprazole (Losec) 藥物之作用，下列何者正確？(A)中和胃酸(B)減少胃酸分泌(C)根除幽門螺旋桿菌(D)保護胃黏膜		
7.	次全胃切除手術 (Billroth II) 術後進食後半小時，即感腹絞痛、頭暈、虛弱無力、冒汗及心悸，主因為下列何者？(A)細胞外液迅速移入腸道，快速液體移位減少了循環血量 (B)食糜快速進入腸道，引起細胞內、外液電解質不平衡 (C)高張性碳水化合物食糜進入腸道，促使 insulin 大量分泌 (D)高張性脂肪性食糜進入腸道，促使 amylase 大量分泌。		
8.	有關膽囊切除手術後放置 T 型管的護理照護，下列措施何者錯誤？(A)依醫囑在餐前和餐後可夾緊 T 型管 1~2 小時 (B)當 T 型管無引流物排出時，可進行灌洗、抽吸 (C)術後 7~10 天的糞便為棕色是正常現象 (D)引流液會由血性引流液漸轉為棕綠色膽汁。		
9.	下列有關腹膜炎的敘述，何者正確？(A)可引起體液轉移、循環改變、呼吸及感染問題等全身反應 (B)主要症狀為發燒、腹部僵硬如木板、腹痛、腸音明顯增加 (C)膽囊破裂造成的續發性腹膜炎，皮膚會出現黃疸 (D)病患若出現噁心、嘔吐情形，有可能會出現代謝性酸中毒。		
10.	病人近日來胸口常有燒灼感，今來門診發現有胃食道逆流情形，下列護理措施適當者為：①教導少量多餐，睡前最好喝杯熱牛奶②建議作彎腰運動來緩解症狀③採低油飲食④鼓勵戒菸⑤建議臥床時搖高床頭。(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤。		
11.	有關直腸腫瘤手術前後之護理措施，下列何者錯誤？(A)術前予靜脈注射 neomycin(B)術前三天採低渣及清流飲食(C)結腸造瘻灌洗時，灌洗桶內裝 500~1000 c. c. 溫水(D)術後教導避免產氣或腹瀉的食物。		
12.	有關類風濕性關節炎(Rheumatoid Arthritis)患者手腳關節之臨床表徵，下列何者正確？(A)腳前部變寬、足趾向下側曲(B)呈現冰冷、蒼白、活動度受限(C)呈現腕道症候群(carpal tunnel syndrome)造成手指麻木和刺痛感(D)關節僵硬疼痛的症狀在傍晚最嚴重。		
13.	有關全髖關節置換手術後的出院前護理指導，下列何者錯誤？(A)每天做適當運動(B)選用較低的馬桶座(C)坐下時，保持患肢外展(D)多喝水、攝取低脂肪高纖維食物。		
14.	下肢骨折病患接受石膏固定後，主訴固定處疼痛，患肢末梢冰冷、脈搏較弱及感覺異常。此時病患可能有下列何種合併症？(A)脂肪栓塞(Fat embolism)(B)腔隙症候群(Compartment syndrome)(C)佛克曼氏缺血性攣縮(Volkmann's ischemic contracture)(D)感染(Inflection)。		
15.	針對於骨骼肌肉系統病患，常以 6P 評估其神經血管功能，此 6P 即疼痛 (Pain)、蒼白 (Pallor)、脈搏消失 (Pulselessness)、溫度改變 (Poikilothermy)，以及下列何者？ (A)麻痺 (Paralysis) 和姿勢 (Posture) (B)感覺異常 (Paresthesia) 和位置 (Position) (C)姿勢 (Posture) 和位置 (Position) (D)麻痺 (Paralysis) 和感覺異常 (Paresthesia)。		
16.	有關牽引的原則，下列敘述何者正確？(A)牽引繩索須在滑輪軌道內並打結，以防止牽引錘滑脫 (B)牽引錘須應保持懸空，以免增加摩擦力 (C)只要病患感覺疼痛，應立即中斷牽引 (D)牽引錘重量的增減，可依病患的耐受度隨時調整。		
17.	根除性膀胱切除術合併迴腸導管尿路改道術 (ileal conduit) 後之護理處置，下列何者正確？(A)造瘻口呈粉紅色潮濕狀時，須通知醫師處理(B)術後第一天出現鮮紅色血尿是正常情況(C)鼓勵進食酸性食物，以酸化尿液(D)尿液排出混濁，予以灌洗造瘻口。		
18.	下列四種結石型態，何者不易在酸化尿液產生？(1)磷酸銨鎂結石(2)磷酸鈣結石(3)尿酸結石(4)胱胺酸結石：(A)(1)(2)(B)(1)(3)(C)(2)(3)(D)(3)(4)。		
19.	有關尿失禁行為治療的敘述，下列何者為非？(A)對需依賴他人照顧的患者，照顧者需協助規劃如廁時間 (B)膀胱		

	訓練不管任何時間皆需持續進行做訓練 (C) 膀胱訓練適用於壓力性和急迫性尿失禁患者 (D) 骨盆底肌肉復健可增加骨盆底肌肉之肌力與協調性。
20.	逆行性射精為經尿道前列腺切除術 (TURP) 後合併症，下列敘述何者錯誤？(A)病患的尿液呈混濁現象(B)病患的精液是射入輸尿管中(C)病患會出現性高潮(D)病患會出現勃起現象
21.	有關急性腎衰竭的臨床病程，下列何者錯誤？(A)起始期，出現持續性低血壓 (B)先出現代償性多尿期，再進入少尿期 (C)少尿期，出現低血鈉與高血鉀 (D)若無腎臟損傷，數月至1 年可恢復正常。
22.	有關甲狀腺功能亢進與甲狀腺功能低下病患的比較，下列何者錯誤？(A)皆會出現惡性貧血(B)皆可造成情緒的困擾(C)皆有醫源性的致病因素(D)女性皆有月經不規則情形。
23.	有關糖化血色素(HbA1c)之敘述，下列何者正確？(A)糖化血色素僅能在糖尿病的患者身上驗出(B)空腹8 小時後，抽靜脈血測量葡萄糖和血紅素結合的反應(C)檢查結果可反應患者過去3 個月內的血糖控制情形(D)糖化血色素 $\geq 12\%$ 表示血糖過高，才可確定診斷為糖尿病。
24.	有關協助庫欣氏症候群(Cushing's syndrome)患者適應身體心像改變之護理措施，下列何者錯誤？(A)告訴患者在治療後，身體外觀的改變會逐漸恢復正常(B)協助家人瞭解，患者的情緒波動是疾病的症狀之一(C)教導患者以衣服或飾物，來遮掩身體外觀的改變(D)鼓勵患者參與社交活動，不要在乎他人異樣眼光。
25.	進行成人的心肺腦復甦術 (CPCR)，下列敘述何者正確？(A)二人施救時，心外按摩與人工呼吸的比率為5：1(B)對於異物阻塞的孕婦應使用腹部推壓法來急救(C)倘若病患胸部未隨吹氣而起伏，應立即改由鼻部吹入(D)CPCR 成功的徵象為瞳孔縮小、眨眼及開始自動呼吸。
26.	情況：肺塵症病患因呼吸衰竭接受氣管內插管及呼吸器治療。某日，突然意識改變、呼吸費力，右肺呼吸音消失、叩診為鼓音、觸診氣管偏向左側。請依此回答以下 26-27 題。病患可能出現何種合併症？(A)開放性氣胸(open pneumothorax) (B)張力性氣胸(tension pneumothorax) (C)急性呼吸窘迫症候群 (D)急性呼吸衰竭。
27.	下列何者為首要之護理措施？(A)準備氣管切開術所需之物品 (B)準備大號針頭，協助醫生進行肋膜腔放氣 (C)調升呼吸器的呼氣末期正壓(positive end-expiratory pressure) (D)調升呼吸器的呼吸速率與氧氣濃度。
28.	氣喘患者之肺功能測量結果，下列何者正確？(A)功能性肺餘量(FRC)下降 (B)尖峰吐氣流速(PEFR)下降 (C)持續惡化時，二氧化碳分壓(PaCO ₂)增加 (D)第一秒用力呼氣容積(FEV ₁)增加。
29.	有關氣切造口手術後之護理措施，下列何者正確？(A)每天更換氣切套管以避免感染 (B)氣囊不宜充氣以避免刺激氣管 (C)不可進行氣切造口護理以避免出血 (D)若吞嚥反射正常，可由口進食。
30.	下列那些是施行姿位引流(postural drainage)的禁忌對象？(1)顱內壓升高(2)心肌梗塞(3)慢性支氣管炎(4)消化性潰瘍：(A)(1)(2) (B)(3)(4) (C)(1)(3) (D)(2)(4)。
31.	有關以胸腔引流排除肋膜腔積聚之液體的敘述，下列何者正確？(A)胸管尖端由第二肋間插入 (B)水下引流管內之液面在吸氣時會下降 (C)每小時引流液超出 50c. c. 時，要立即報告醫師 (D)拔管時，請病患深吸氣後摒住呼吸。
32.	有關病患接受人工心臟節律器置入術之出院衛教內容，下列何者有誤？(A)一週後才可以執行全範圍的關節運動 (B)術後 6 週內避免抬舉大於 5 磅的重物 (C)不宜做核磁共振之檢查 (D)節律器置入後如有持續打嗝或胸痛現象，宜正常休息，並減少食量。
33.	有關急性心肌梗塞病人的處置，下列敘述何項正確？(A)使用血栓溶解劑目的在使冠狀動脈內血塊溶解以恢復供血(B)胸痛發生後 3~6 小時內使用抗凝劑(Heparin)可使血栓溶解 (C)使用舌下含服硝酸甘油(NTG)後應站立或來回走動，增進藥效 (D)急性心肌梗塞後第 3 天的病患，活動時感到胸悶、呼吸困難、暈眩以及盜汗，可讓病患維持頭低腳高的姿勢。
34.	有關高血壓個案生活型態的護理指導，下列何者錯誤？(A)鼓勵限菸限酒 (B)鼓勵減輕體重 (C)鼓勵浸泡溫泉 (D)鼓勵攝取纖維。
35.	依據斐爾科三要素(Virchow's triad)分析，下列何者是長期接受靜脈注射病患最可能出現深層靜脈血栓的原因？(A)靜脈血流停滯 (B)凝血能力增加 (C)靜脈管壁損傷 (D)靜脈瓣膜閉鎖。
36.	風濕性心內膜炎最常侵犯之瓣膜為下列何者？(A)二尖瓣 (B)三尖瓣 (C)主動脈瓣 (D)肺動脈瓣。
37.	冠狀動脈繞道手術(CABG)使用心肺體外循環，下列何者為靜脈注射protamine sulfate之目的？(A)對抗heparin的抗凝血作用 (B)增強vitamin K的凝血作用 (C)降低potassium的濃度 (D)增強digoxin的作用。
38.	下列何項檢查可以確立重症肌無力(myasthenia gravis)的診斷？(A)心電圖(EKG) (B)血漿去除術(plasmapheresis)測試(C)乙醯膽鹼酶抑制劑試驗(Tensilon test)(D)核磁共振檢查(MRI)。
39.	下列何項不是顱底骨折的病人常見的臨床症狀？(A)熊貓眼(Raccoon eyes) (B)巴特爾氏徵象(Battle's sign) (C)斜視 (D)半邊臉輕癱。
40.	錢先生為馴馬師，日前由馬背上摔下來，造成脊髓橫斷，兩星期後似乎有脊髓休克恢復的現象，請問下列何者為脊髓休克(spinal shock)恢復的指標？(A)膀胱排空反射減弱 (B)肌肉功能增強 (C)腸道張力減弱 (D)自主反射增強。
41.	有關巴金森氏症的活動指導，下列何者正確？(A)穿很多鈕扣的衣服，以維持手指的靈活度 (B)避免全關節活動，以免太疲累 (C)採用底面積較寬的助行器來維持平衡 (D)鼓勵坐柔軟且深的椅子。
42.	依據美國疾病管制中心(CDC)對人類免疫不全病毒特徵的分類，當出現伺機性感染，與CD4細胞數少於200/mm ³ 時是屬於

	那一族群？(A)第一族群 (B)第二族群 (C)第三族群 (D)第四族群。
43.	人類發生過敏反應時，下列何種白血球的數目會增加？(A)嗜中性白血球 (B)嗜酸性白血球 (C)嗜鹼性白血球 (D)單核球。
44.	有關全身性紅斑性狼瘡的敘述，下列何者錯誤？(A)是一種急性、發炎性、全身性的自體反應 (B)抗體抗原形成之免疫複合物沉積在血管壁造成發炎與組織壞死 (C)常見關節發炎、疼痛、腫脹 (D)在面頰和鼻樑兩側有蝴蝶斑。
45.	有關照顧愛滋病病人的感染控制措施，下列何者正確？(A)與病人談話時，一定要戴口罩、穿隔離衣 (B)背部護理時需穿隔離衣並戴口罩 (C)護理人員在照護後天免疫缺乏症候群病人不慎發生針扎時，於72小時內給予單株抗體 (D)病人的排泄物應先用漂白水浸泡約30分鐘至1小時，再沖入馬桶。
46.	有關非何杰金氏淋巴瘤之敘述，下列何者錯誤？(A)好發於中老年男性病人 (B)目前可採取化學治療、骨髓移植或免疫治療 (C)侵犯骨髓時，病人之血液檢查值常見尿酸及鈣值有降低情形 (D)不對稱的無痛性淋巴結腫大為常見的臨床表徵之一。
47.	有關男性成人抽血檢查結果，下列何者為正常？①RBC 350萬/ μL ②Hct 45%③Hb 15 gm/dL④WBC 12,000個/ μL ⑤絕對嗜中性白血球 (ANC) 2,000/ μL 。(A) ①②③ (B) ①④⑤ (C) ②③⑤ (D) ③④⑤。
48.	下列哪些化學治療藥物靜脈注射時，若不慎造成外漏，較易造成組織壞死？ 1. cisplatin 2. doxorubicin 3. vincristine 4. prednisolone。(A)12 (B)23 (C)14 (D)34。
49.	癌症病人接受高劑量化學治療後，若發生急性腫瘤溶解徵候群 (acute tumor lysis syndrome; ATLS)，會出現何種變化？(A)血鉀偏高 (B)血磷偏低 (C)尿酸偏低 (D)白蛋白偏低。
50.	下列何者對於放射線治療的敏感度最差？(A)位於分裂期的細胞 (B)含氧量較高的細胞 (C)分化良好的細胞 (D)血液供應豐富的細胞。