

新生醫護管理專科學校 111 學年度 第 2 學期 護理師執照複習考 產科護理學 科目答案卷

適用科別班級：護理科 四 年級
命題教師：產科教師群

學制：■五專
時間：■一般日

試卷請回收

選擇題 50 題，每題 2 分，共 100 分

題號	答案	題目
1	D	初產婦最適宜送產臺時間是在子宮頸口開幾公分時？(A)未開時 (B)2 公分 (C)4 公分 (D)全開時。
2	C	王太太產後第二天主訴小腿疼痛，並出現 Homan's sign (+)，護理師應鼓勵：(A) 下床活動 (B) 局部按摩小腿 (C) 臥床休息 (D) 多喝水。
3	A	下列何者不是分娩時陰道檢查可以獲得的資料？(A)得知骨盆的類型 (B)確定胎兒先露部位 (C)子宮頸口擴張及變薄程度(D)測定胎兒先露部位通過骨盆的情形及其高度。
4	D	在第一產程時待產過程中，改善宮縮疼痛的方法，下列何項不適合？(A)引導拉梅茲呼吸 (B)協助生產求使用 (C)予以按摩及支托 (D)教其憋氣用力。
5	C	待產婦如果出現下列何種產兆時，應在 24 小時內引產？(A)現血 (B)腹輕感 (C)胎膜破裂 (D)假性陣痛。
6	B	早期產後出血最常見的原因為下列何者？(A)子宮破裂 (B)子宮張力不全 (C)生殖道裂傷 (D)瀰漫性血管內凝血
7	A	護理人員在第四產程主要的評估項目不包括：(A)排便情形 (B)血壓 (C)宮底位置 (D)惡露量。
8	C	當胎兒伸展娩出過程中，護理師應教導產婦執行的呼吸為：(A)腹式深呼吸 (B)胸式深呼吸 (C)哈氣 (D)閉氣用腹壓。
9	D	胎位為 RSP，所代表的意義為何？(A)胎兒的枕骨，在母親的右邊 (B)胎兒的薦部，在母親子宮底的地方 (C)兒的枕部，在母親的右邊 (D)胎兒的薦骨，在母親的右後方。
10	B	下列關於子宮頸擴張及變薄的順序，何者正確？ (A)初產婦：先擴張再變薄 (B)初產婦：先變薄再擴張 (C)經產婦：先擴張再變薄 (D)經產婦：先變薄再擴張
11	A	林太太，G2P1A1，於胎盤娩出後醫囑使用 methergine，下列何種情況護士應暫停給藥？(A)血壓 160/100 mmHg (B)呼吸 20 次 (C)林太太躁動不安 (D)Homan's sign (+)。
12	D	胎盤娩出方法中的鄧氏法剝離，下列敘述何者正確？(A) 由中央先剝離，再往邊緣剝離 (B) 失血量較少 (C) 由胎兒面先行娩出 (D) 比希氏法少見。
13	C	真陣痛和假陣痛的不同，下列何者是真陣痛的特徵？(A)活動可使宮縮減輕 (B)子宮頸口不會隨宮縮而擴張 (C)子宮頸會漸漸變薄 (D)子宮內壓力約在 10~20 mmHg。
14	D	下列何項敘述最接近第二產程？(A) 子宮頸變薄為 60%，擴張 1Fb，高度-1 (B) 子宮頸變薄為 70%，擴張 2Fb，高度 0 (C) 子宮頸變薄為 80%，擴張 3Fb，高度+1 (D) 子宮頸變薄為 90%，擴張 4Fb，高度+2。
15	A	關於產後子宮復舊不全的敘述，下列何者為非：(A)紅惡露的分泌期縮短 (B)偶有不規則過量的無痛性的子宮出血 (C)骨盆腔有下墜感 (D)可能引起子宮內膜炎，並導致子宮壓痛及背痛情形。
16	C	護理人員了解 Effacement 所指為下列何者？ (A)子宮頸口擴張的程度 (B)子宮有效收縮的強度 (C)子宮頸變薄變短的程度 (D)先露部下降的程度
17	A	生產時的子宮與子宮頸敘述，下列何者正確？ (A)子宮生理性收縮環分為兩段，藉由上段肌肉收縮而使下段肌肉收縮 (B)子宮頸薄化以公分計 (C)初產婦子宮頸先擴張再變薄 (D)經產婦先變薄再擴張
18	C	當胎盤灌流不足時，易產生那一類型的胎心率減速？(A)早期減速 (early deceleration) (B)中期減速(middle deceleration) (C)晚期減速 (late deceleration) (D)變異性減速。
19	B	影響待產婦能否順利分娩的四個重要因素，下列何者為非？ (A)產道 (B)上臂肌肉的強度 (C)分娩力量 (D)精神層面
20	A	正常的子宮收縮強度，以何處最強？ (A)子宮底 (B)子宮體 (C)子宮體兩側 (D)子宮下段
21	C	下列胎頭的最短徑線？ (A)雙頂徑 (B)枕額徑 (C)枕下前囟徑 (D)枕額徑
22	D	分娩開始的原因，和下列何種荷爾蒙的增加無關？ (A)雌性素 (B)胎兒腎上腺素(Fetal cortisol) (C)前列腺素 (Prostaglandin) (D)黃體素(Progesterone)
23	B	胎位是左枕前位(L.O.A.)的母親，最容易聽到胎心音的位置是在母親的：(A)左上腹部 (B)左下腹部 (C)右上腹部 (D)右下腹部
24	D	會陰切開術常於何時執行？(A)胎頭下降高度為+1 時 (B)子宮頸全開 (C)子宮頸變薄 100% (D)胎頭著冠時。
25	C	胎兒在子宮內缺氧時，羊水形成甚麼顏色？(A)黃色 (B)紅色 (C)黃綠色 (D)墨綠色。
26	C	通常子宮肌肉收縮壓力至少要超過多少 mmHg 以上，待產婦才會有疼痛的感覺？(A)10 (B)20 (C)30 (D)40。
情況：王太太妊娠 39 週，已有產兆，而住院待產，經內診而判斷子宮頸口已開四指，由胎兒監視器(Fetal monitor)上，發現當王太太宮縮開始時，胎心音就由 160bpm 開始下降；而在宮縮達到最強時，胎心音也降到最低約 120bpm，隨著收縮的恢復，胎心音也回至基準線附近。請以此情況回答下列 3 題：		
27	A	上述情況之正確判斷為下列何項？(A)早發性減速(early deceleration) (B)晚發性減速(late deceleration) (C)變異性減速(variable deceleration)(D)正常的表徵。
28	C	上述情況的發生原因，下列何項為正確？(A)胎兒低血糖 (B)胎盤機能不足 (C)胎頭壓迫 (D)胎兒臍帶受壓迫。
29	A	下列護理措施，何項最恰當？(A)不做特別處理 (B)協助進食 (C)給予改變臥姿 (D)準備緊急剖腹生產。
30	C	陰道內診後，坐骨棘假想連線(station)為-2，其意義為胎兒先露部到達那個位置？(A)坐骨棘連線上方 2 指 (B)棘連線下方 2 指 (C)坐骨棘連線上方 2 公分 (D)坐骨棘連線下方 2 公分。
31	D	下列何項是待產婦「真陣痛」的特徵？(A)疼痛侷限在腹部附近 (B)爬樓梯可以減輕疼痛 (C)收縮時間及間隔不 (D)子宮頸有擴張變化。
32	C	子宮按摩時的描述何者錯誤？(A)一隻手放在恥骨聯合固定子宮 (B)環形輕柔按摩 (C)子宮軟按摩至醫師到達時 (D)另一隻手放宮底按摩

33	D	自然生產媽媽產後第三天，下列何項不應是其執行的產後運動項目？(A)凱格爾運動 (B)胸部運動 (C)呼吸運動 (D)仰臥起坐。
34	C	產後詢問使用保險套的避孕法，護士回答下列何者正確？(A)有子宮外孕病史者勿用 (B)哺餵母乳者不適用 (C)正確使用避孕效果可達 90%，亦可預防性接觸傳染病 (D)可重複使用經濟實惠。
35	C	自然產失血量多少定義為大出血？(A)200 (B)300 (C)500 (D)1000 ml
36	C	胎心音辨異性正常範圍是多少 bpm？(A)0-2 (B)3-5 (C)6-10 (D)20-25。
37	D	產婦 G ₁ P ₁ ，月經週期一直不準，打算間隔三年後才要再生第二胎。下列何種避孕方法最適合其採用？(A)結紮 (B)安全期 (C)體外射精 (D)子宮內避孕器。
38	A	自然生產施行輸卵管結紮手術最適宜的時間是在產後：(A)48 小時 (B)一週 (C)兩週 (D)一個月。
39	B	產後 2 小時內最常見的產婦合併症為：(A)感染 (B)產後出血 (C)憂鬱症 (D)高血壓
40	A	產婦產後，一直擔心自己身體希望多休息，是下列何項時期之行為特性？(A)接受期(taking-in phase) (B)放手期(letting-go phase) (C)緊執期(taking-hold phase) (D)出院期(going-home phase)。
41	B	第四產程在恢復室內觀察 2 小時，需要注意的護理問題是：(A)產後感染 (B)產後出血 (C)脈搏過緩 (D)姿勢性低血壓。
42	D	產後第 3 天宮底在大約何處？(A)臍平 (B)臍下一指 (C)臍下二指 (D)臍下三指。
43	D	產後第 5 天，惡露大約形成甚麼顏色？(A)黃色 (B)紅色 (C)鮮紅色 (D)棕色。
44	D	產後多久需第一次解尿？(A)1-3 (B)3-4 (C)5-6 (D)6-8 小時。
45	C	產後宮底何時下降至骨盆腔？(A)3-5 天 (B)一星期 (C)10-14 天 (D)一個月。
46	D	當產婦進行硬膜外麻醉(無痛分娩)時，下列何者是護理人員需優先注意觀察副作用？(A)監測子宮是否強直 (B)給予催產素增強宮縮 (C)給予平躺預防頭痛 (D)監測血壓是否降低。
47	B	有關產後凱格爾是運動的功能，下列何者錯誤？(A)增加骨盆腔血液循環(B)促進恥骨尾骨底骨肌肉復原(C)預防子宮內膜感染(D)促進會陰切開。
48	D	一般人常用的避孕方法中，失敗率最高的是：(A)男用保險套 (B)口服避孕藥 (C)子宮內避孕器 (D)月經週期(安全期推算法)。
49	D	產後評估出現霍曼氏徵象，這表示張太太有下列何者？(A)產後憂鬱症 (B)腹直肌分離 (C)子宮感染 (D)深層血栓靜脈炎。
50	B	下列何者為產後子宮復舊的生理機轉？(A)肌細胞的數目減少 (B)肌肉細胞產生自體溶解(autolysis)的現象 (C)血中動情素(estrogen)濃度上升 (D)血中黃體素(progesterone)之濃度不變。